


. 

# CICINDELIDAE

PAR

W. HORN (Berlin)



# **CICINDELIDAE**

PAR

# W. HORN (Berlin)

# 1. — Tricondyla aptera (OLIVIER, 1790).

Dix-huit exemplaires capturés aux îles Aroe (S. Manoembai, 25-26.III.1929), à l'île Weim (N. Misool, 28.II.1929) et en Nouvelle-Guinée (Sakoemi, vers Moemi, Siwi, 7-11-12.III.1929).

# 2. — Cicindela stenodera Schaum, 1861.

Un sujet à Bantimoerang (Makassar-Célèbes), le 1.II.1929.

# 3. — Cicindela decemguttata Fabricius, 1801.

Deux exemplaires dans la forêt vierge entre Paloe et Koelawi (Célèbes), le 4.II.1929.

# 4. — Cicindela aurulenta Fabricius, 1801.

Cinq individus capturés à Sumatra (Kepahiang, 17.IV.1929) et à Bornéo (Samarinda, 9.II.1929).

#### 5. — Cicindela versicolor Mac Leay, 1825.

Sumatra (Padang, 21.IV.1929), un exemplaire.

# 6. — Cicindela ancorifera W. Horn, 1896-97.

Nouvelle-Guinée (Sakoemi, 11.III.1929), un exemplaire.

# 7. — Thopeutica eximia var. diana J. Thomson, 1859.

Dans la forêt vierge entre Paloe et Koelawi (Célèbes, 4.II.1929), deux exemplaires.

#### 8. — Heptodonta analis (Fabricius, 1801).

Sumatra (Bireun-Takengon, 8.V.1929), un seul sujet.

# 9. — Therates labiatus (Fabicius, 1801).

Célèbes (forêt vierge entre Paloe et Koelawi, 4.II.1929; Tanggarie-Menado), sept exemplaires.

Ile Weim (N. Misool, 5.III.1929), un exemplaire.

Ile Aroe (S. Manoembai, 25-26.III.1929), quatre exemplaires.

Nouvelle-Guinée (Kaimana, 19.III.1929), un exemplaire.

# 10. — Therates basalis Dejean, 1826.

Un exemplaire trouvé en Nouvelle-Guinée (Moemi, 5.III.1929).

#### 11. —Therates chaudoiri Schaum.

Siwi (Nouvelle-Guinée, le 8.III.1929), un sujet.